

هشدار

تزریق عضلانی دیکلوفناک و فلج ناشی از آن

دیکلوفناک سدیم یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) بوده که به منظور رفع التهاب و درد استفاده می شود. متأسفانه اخیراً آمار نگران کننده ای از عوارض ناشی از تزریق عضلانی این دارو بخصوص در کودکان به مرکز ثبت و بررسی عوارض داروها گزارش شده است، که لازم می دانیم موارد ذیل را هرچه سریعتر به اطلاع همکاران محترم برسانیم:

عوارض گزارش شده ناشی از تزریق عضلانی دیکلوفناک طی چند ماه اخیر عبارتند از:

فلج پا (۲۱ مورد بویژه در کودکان)، نکروز، آبسه، درد، تورم و کبودی در محل تزریق، که در برخی موارد منجر به بستری شدن، عمل جراحی و انجام فیزیوتراپی گردیده است. بروز این تعداد از عوارض طی یک محدوده زمانی کوتاه، قابل تامل و نگران کننده است. لازم به ذکر است که تعداد گزارشات دریافت شده توسط این مرکز طی چند ماه اخیر از کل گزارشات ارسال شده به WHO از کشورهای مختلف در طول یکسال بیشتر است.

● با توجه به اطلاعات موجود در کلیه کتب معتبر، تزریق این دارو در کودکان زیر ۱۳ سال به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

● تزریق عضلانی این دارو به عنوان ضد تب در کودکان از موارد ثابت شده مصرف این دارو نیست.

● تزریق عضلانی این دارو در بزرگسالان در درمان مواردی مانند **ureteric colic** و درد بعد از جراحی توصیه می گردد.

● به منظور کاهش آسیبهای بافتی ناشی از تزریق عضلانی این دارو در بزرگسالان، لازم است تزریق بصورت عمیق در عضله سرینی صورت گیرد. بدیهی است دقت در نحوه تزریق می تواند بطور قابل توجهی از شدت عوارض موضعی این دارو بکاهد.

● از آنجایی که مصرف فرم تزریقی دیکلوفناک در کشور ما بطور غیر قابل قبولی زیاد است، توصیه می شود که جز در موارد کاملاً ضروری از مصرف این دارو بخصوص در کودکان خودداری گردد.

خواهشمند است در صورت مشاهده هرگونه عارضه، فرم مخصوص ثبت و بررسی عوارض داروها را تکمیل نموده و به آدرس تهران- خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - ساختمان شماره ۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - مرکز ثبت و بررسی عوارض داروها- دفتر تحقیق و توسعه ارسال نموده و یا با شماره تلفن ۶۴۰۵۵۶۹ تماس حاصل فرمایید.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها- دفتر تحقیق و توسعه- معاونت غذایی و

دارویی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی