

## بررسی میزان شیوع آفت در بیماران مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان

دانشکده دندانپزشکی رفسنجان پاییز ۷۸

استاد راهنما: دکتر جلیل مومن بیت الهی

نگارش: علی رضا پورمحمد

شماره: ۵۴

چکیده

تحقیق حاضر میزان شیوع آفت در ۴۲۲ مورد بیمار مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان رد پائیز ۱۳۷۸ را بصورت مقطعی (cross-sectional) مورد بررسی قرار می دهد. نوع مطالعه توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات به کمک پرسشنامه و معاینه دقیق صورت گرفته است. این بیماران که در سنین بین ۱۲ تا ۶۸ سال بودند، ۲۷۰ نفر زن و ۱۵۲ نفر مرد بودند. ضایعه آفت در ۱۹ (۴/۵٪) مورد از بیماران مشاهده شد. ولی ۹۶ مورد از بیماران سابقه آفت را بیان کردند. بنابراین میزان شیوع آفت ۲۲/۷٪ مشاهده گردید. میزان شیوع رد مردان ۱۷/۸٪ و در زنان ۲۵/۴٪ بود. از نظر نوع، آفت کوچک (با شیوع ۸۰٪) بیشترین، آفت بزرگ (۱۰/۵٪) و آفت تبخالی شکل (۹/۵٪) به ترتیب میزان شیوع کمتری را نشان دادند؛ از لحاظ محل وجود آفت، لب و بعد از آن وستیبول و گونه شایعترین مکان وقوع آفت بود و کمترین میزان وقوع در کام وجود داشت. بیشترین میزان شیوع آفت در دهه دوم و سوم زندگی دیده شد و با افزایش سن کاهش نشان داد. از میان کل بیماران ۹/۲٪ سابقه حساسیت را بیان کردند در حالی که ۱۹/۸٪ از افرادی که سابقه آفت را بیان کردند سابقه حساسیت هم داشتند که از نظر آماری معنی دار بود. در میان بیماران با سابقه آفت ۴۲/۷٪ سابقه آن را در اقوام درجه یک بیان کردند که از لحاظ آماری معنی دار بود در این تحقیق رابطه‌ای بین سیگار و وقوع آفت مشاهده نشد.