

بررسی میزان شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در بیماران بی دندانی ناقص مراجعه کننده به

دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳۷۷

استاد راهنما: دکتر پرویز امینی

نگارش: احمد نظری

شماره: ۴

چکیده

در این تحقیق ۱۲۵ بیمار بی دندانی ناقص در طول ۷ ماه غیر متوالی در سال ۱۳۷۷ در بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی رفسنجان از نظر سلامت و بیماری مفصل گیجگاهی فکی مورد معاینه قرار گرفتند ۸/۷۶٪ از بیماران مورد مطالعه دچار اختلالات مفصل گیجگاهی فکی بودند و تنها ۴/۳۵٪ مبتلایان از مشکلات خودآگاهی داشتند. شایع‌ترین یافته پاتولوژیک مفصل، صدای مفصلی بوده است. بیشترین شیوع اختلالات در اکلوژن کلاس دو انگل و از نظر اکلوژن فانکشنال در گروپ فانکشن مشاهده شد. هر چه طول مدت زمان بی‌دندانی بیشتر باشد میزان مربوط به حالت بی‌دندانی انتهایی آزاد بود و بیشترین تماسهای پیش رس در حرکت پیشگرایی مشاهده گردید.

---