

فراوانی بوی بد دهان (هالیتوزیس) با منشأ بیماری های پریدونتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده

دندانپزشکی رفسنجان

استاد راهنما: دکتر محمد مهدی یاقوتی خراسانی، دکتر ابولقاسم شهاب احمدی

مشاور: احمد رضا صیادی

نگارش: سید محمد حسینی

شماره: ۳۳۴

چکیده

مقدمه: بوی بد دهان (Halitosis)، بوی نامطبوع و آزاردهنده حفره دهان بدون در نظر گرفتن منشأ آن است که معمولاً باعث خجالت فرد شده، می تواند بر روابط و عملکرد اجتماعی وی تاثیر بگذارد. بوی بد دهان مشکلی عمده در بین بیماران دندانپزشکی است، بطوری که در برخی پژوهش ها این عامل، سومین علت مراجعه به دندانپزشکی بعد از پوسیدگی و بیماری های پریدونتال شناخته شده است. برای بوی بد دهان دلایل ایجاد کننده متعددی ذکر شده که یکی از آنها مشکلات پریدونتال است که در مقالات موجود، فراوانی های مختلفی برای آن در بیماران دچار بوی بد دهان گزارش شده است و لذا بر آن بودیم با انجام پژوهش حاضر به بررسی فراوانی بوی بد دهان با منشأ بیماری های پریدونتال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رفسنجان بپردازیم.

مواد و روش ها: از بین ۶۳۵ بیمار بزرگسال مراجعه کننده، ۴۱ نفر دچار هالیتوزیس بودند که پرسشنامه ای برای ایشان تنظیم شد و تعداد افرادی که بوی بد دهان با منشأ بیماری های پریدونتال داشتند پس از کدبندی توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ در رایانه تجزیه و تحلیل شدند و با کمک روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و تحلیلی (کای اسکوئر- فیشر) مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها : در این مطالعه شیوع هالیتوزیس در بین کلیه بیماران مراجعه کننده ۶٪ (۴۱ نفر) بود و ۳۱ نفر (۷۵/۶٪) از بیماران، هالیتوزیس با منشأ بیماری های پریدونتال (۲۶ نفر پریدونتیت و ۵ نفر جینجیویت) داشتند.

نتیجه گیری : با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که بیماری های پریدونتال سهمی بسزا در ایجاد بوی بد دهان دارند.

واژگان کلیدی: بوی بد دهان، بیماری های پریدونتال، بیمار بزرگسال.

www.rums.ac.ir