

تعیین شیوع دندانهای کانین نهفته و نابجا رویش یافته در دانش‌آموزان ۱۴ ساله دختر شهر رفسنجان

در سال ۷۸

استاد راهنما: دکتر بهمن صدقی

نگارش: مراد شاهی

شماره: ۵۸

چکیده

تحقیق حاضر شیوع دندانهای کانین نهفته و نابجا رویش یافته را در ۵۷۲ نفر از دانش‌آموزان ۱۴ ساله دختر شهر رفسنجان در سال ۱۳۷۸ از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای - تصادفی ساده مورد بررسی قرار می‌دهد و نتایج بدست آمده بشرح زیر می‌باشد:

شیوع دندانهای کانین نهفته در دختران ۱۴ ساله شهر رفسنجان ۵/۲ درصد تعیین شد. همه موارد نهفتگی در فک بالا مشاهده شدند و هیچ موردی از دندانهای کانین نهفته در فک پایین ملاحظه نگردید.

نهفتگی دندان کانین بصورت یک طرفه بیشتر از دو طرفه بود و اختلاف بین آنها معنی‌دار بود.

نهفتگی پالاتالی بیشتر از باکالی بود و اختلاف بین آنها نیز معنی‌دار بود. (۸۰ درصد پالاتالی، ۲۰ درصد باکالی)

در ۶/۷ درصد نهفتگی‌ها، کانین شیری مربوطه افتاده بود و در ۹۳/۳ درصد موارد نهفتگی، کانین شیری مربوطه نیفتاده بودند و اختلاف بین آنها معنی‌دار بود.

شیوع دندانهای کانین نابجا رویش یافته در دختران ۱۴ ساله شهر رفسنجان ۱۰/۳ درصد تعیین شد.

کانین نابجا رویش یافته در فک بالا بیشتر از فک پایین بود و اختلاف بین آنها معنی‌دار بود. کانین نابجا رویش یافته یک طرفه بیشتر از دو طرفه بود. اختلاف بین آنها از لحاظ آماری معنی‌دار بود.

کانین نابجا رویش یافته باکالی بیشتر از پالاتالی بود. اختلاف بین آنها از لحاظ آماری معنی‌دار بود.

کانین‌های شیری در بیشتر موارد رویش نابجای دندان کانین افتاده بودند.

ارتباط معنی‌داری بین ازدواج فامیلی و غیر فامیلی با نهفتگی و رویش نابجای دندان کانین وجود نداشت.