

بررسی میزان شیوع براکسیزم و کلنچینگ در بیماران مبتلا به اختلالات مفصل گیجگاهی فکی

مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رفسنجان سال ۱۳۷۷

استاد راهنما: دکتر پرویز امینی

نگارش: حسین عباسیان راد

شماره: ۵

چکیده

در این مطالعه ۱۶۰ بیمار دارای اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در طول ۷ ماه غیر متوالی در سال ۱۳۷۷ در بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی رفسنجان از نظر داشتن براکسیزم یا کلنچینگ مورد معاینه قرار گرفتند و ۷۱/۲۴٪ آنها دارای براکسیزم یا کلنچینگ یا هر دو بودند و از این تعداد ۷۱/۹٪ آنها نسبت به عادت خود آگاهی داشتند و درصد براکسیزم و کلنچینگ در زنان تحت مطالعه (۸۱/۶۹٪) بیشتر از مردان (۶۲/۹۲٪) بود. بیشترین شیوع براکسیزم و کلنچینگ در محدوده سنی ۴۵-۱۵ و در مشاغل کارمند، دانشجو یا محصل مشاهده شد. از بیماران مبتلا به براکسیزم و کلنچینگ ۷۲/۱۶٪ افراد دارای رستوریشن غلط و ۷۱/۹۲٪ افراد دارای مال اکلوزن بودند.

---