

بررسی اندازه عرض لثه کراتینیزه و میزان شیوع تحلیل لثه در بیماران مراجعه کننده به دانشکده

دندانپزشکی رفسنجان در سال ۷۷

استاد راهنما: دکتر سیامک یعقوبی

نگارش: محمود اشرفی با همکاری سید امیر سیدی

شماره: ۷۰۶

چکیده

به منظور تعیین شیوع تحلیل لثه، بررسی خصوصیات افراد مبتلا و اندازه گیری عرض لثه کراتینیزه، تحقیقی به روش توصیفی بر روی تعداد ۵۶۵ نفر از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال ۱۳۷۷ انجام گرفت. با استفاده از پرسشنامه و معاینات بالینی اطلاعات لازم ثبت گردید. در این تحقیق بعضی از عوامل شایع در اتیولوژی تحلیل لثه، شیوع و شدت تحلیل لثه بر حسب میلی متر در سطوح باکال و لینگوال دندانهای فک بالا و پایین و در نهایت، اندازه عرض لثه کراتینیزه بر حسی میلی متر در تمام دندانهای موجود در استثنای دندان مولر سوم ثبت گردید.

نتایج حاصله نشان داد که ۷۰٪ کل افراد دارای تحلیل لثه بوده که کمترین میزان آن رد گروه سنی ۱۵-۲۵ سال و بیشترین میزان آن در گروههای سنی ۴۵-۵۵ سال و ۵۵-۶۵ سال بود که بیشترین میزان شیوع تحلیل لثه در سطح لینگوال دندانهای سانترال فک پایین و کمترین میزان شیوع تحلیل لثه در سطح باکال دندانهای سانترال فک بالا مشاهده شد.

توزیع تحلیل لثه به تفکیک جنس نیز تحلیل لثه را در افراد مذکر بیشتر از جنس مونث نشان داد؛ و در مورد عوامل اتیولوژیکی موثر بر تحلیل لثه، میزان رعایت بهداشت، استعمال دخانیات، کشش فنوم، وجود کراون، کم عمق بودن و سیتبول، تاثیر بیشتری را نسبت به بقیه عوامل نشان دادند.

دندانهای سانترال فک بالا بیشترین میانگین و دندانهای پری مولر پایین کمترین میانگین عرض لثه کراتینیزه را نشان دادند.