

بررسی میزان شیوع فقدان لترالهای فک بالا در دانش آموزان (۶- و + ماه) ۱۰ ساله

شهر رفسنجان در سال ۷۸

استاد راهنما: دکتر جلیل مومن بیت الهی

نگارش: سید ناصر طیبی

شماره: ۴۳

چکیده

فقدان دندان کناری موجب اختلال در تکلم، تنفس، ایجاد فاصله بین سایر دندانها، انحراف خط میانی، اختلال در جویدن، ایجاد تغییر شکل‌هایی مثل مال اکلوزن کلاس III، نازیبایی و اختلال در بهداشت روانی می‌گردد. چنانچه فقدان دندان در سنین پایین تشخیص داده شود با بستن فضای دندانی می‌توان از عوارض یاد شده جلوگیری نمود.

پژوهش حاضر جهت ارائه اطلاعاتی در زمینه شیوع فقدان مادرزادی دندانهای لترال فک بالا در جامعه مورد نظر می‌باشد. تعداد ۱۵۱۰ نفر دانش آموز (۶ ± ماه) ۱۰ ساله در ۳۵ دبستان ابتدائی شهر رفسنجان مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد ۱۸ نفر (۱/۲۰۳ درصد) شامل ۱۱ دختر و ۷ پسر فاقد دندان پیشین کناری فک بالا بودند. از ۷ نفری که فقدان یک طرفه داشتند تعداد ۲ نفر پسر و ۵ دختر بودند و از ۱۱ نفری که فقدان دو طرفه داشتند ۵ نفر پسر و ۶ نفر دختر بودند. از تعداد ۱۸ نفر تنها یک مورد فقدان سایر دندانها را داشت که آنهم سانترالهای پایین بود. در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین جنس و فقدان دندان فک بالا و نیز بین جنس و فقدان یکطرفه یا دو طرفه این دندان دیده نشد.