

بررسی وضعیت پریدونشیوم مادران باردار مراجعه کننده به کلینیک نیک نفس رفسنجان در سال ۸۰

استاد راهنما: دکتر مجید فریدونی

نگارش: فریدون دهکردی با همکاری محمد حسین ایوبی

شماره: ۹۱۹۰

### چکیده

یکی از مشکلات دوران بارداری افزایش استعداد ابتلا به بیماریهای پریدونتال با توجه به آنکه حاملگی به عنوان یک عامل ثانوی بوده و واکنش لثه در برابر محرکهای موضعی را افزایش می دهد. مطالعه مذکور با هدف بررسی وضعیت پریدونشیوم مادران باردار مراجعه کننده به کلینیک نیک نفس رفسنجان در سال ۱۳۸۰ انجام گرفت. تحقیق به روش توصیفی بر روی ۳۲۵ خانم باردار غیر مبتلا به بیماری مشخص سیستمیک انجام شد. که پس از ثبت مشخصات نمونه‌ها وضعیت پریدونشیوم توسط ایندکس CPITN و وضعیت بهداشت دهان به کمک ایندکس OHI-S انجام گرفت.

یافته‌ها نشان دهنده شیوع بیماریهای پریدونشیوم در ۹۱٪ موارد است که با افزایش سن - افزایش تعداد بارداری و افزایش سن بارداری و وضعیت پریدونشیوم بدتر شده که این اختلاف در تمام موارد فوق معنی دار می باشد همچنین در افراد با تحصیلات پایین (بی سواد - ابتدایی) بیماریهای پریدونشیوم بیشتر دیده شد.

در این تحقیق افزایش حجم لثه در ۵۸/۸٪ افراد و تومور حاملگی در ۳/۴ مشاهده گردید. وضعیت بهداشت دهان در بیش از نیمی از افراد بد بوده (۵۷/۸) و فقط ۰/۳ درصد وضعیت بهداشت دهان خوبی داشتند. همچنین نیاز درمانی در ۹۳/۹٪ آموزش بهداشت و ۶۲/۲٪ جرمگیری نیاز داشتند. یافته‌های فوق نشان دهنده آموزش پایین بهداشت دهان و عدم مراقبتهای دندانپزشکی دوران بارداری می باشد.

برای حل مشکل، همت همه همکاران در راه آموزش عمومی مردم و شناخت مشکلات آنها را می طلبد.

واژگان کلیدی: OHI-S - CPITN - بارداری - بیماری پریدونتال - تومور حاملگی