

بررسی اثر ناپروکسن بر روی درد بعد از معالجه ریشه دندان

استاد راهنما: دکتر معصومه صدر لاهیجانی

نگارش: فرحناز نظری

شماره: ۸۰

چکیده

در این مطالعه، مقایسه‌ای بین انسیدانس درد و تداوم درد (duration) بعد از درمان ریشه بوسیله درمان دارویی با Naproxen (250mg) , Placebo انجام گرفت. این مطالعه بصورت Case-Control انجام شد. هیچ کوششی در انتخاب بیمارانی که جهت درمان ریشه مراجعه کرده بودند انجام نشد. تعداد ۳۰ بیمار در گروه Case (Naproxen) و ۳۲ بیمار در گروه (Placebo) Control قرار داشتند و درمان دارویی بصورت Double blind صورت گرفت. درد بیماران با کمک مقیاس توصیفی اندازه‌گیری شد و اطلاعات با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که انسیدانس درد در ۶ و ۷۲ ساعت پس از درمان در گروه Naproxen (Case) به طور معنی‌داری کمتر از گروه (Placebo) Control بود ولی در ما بقی ساعات، اختلاف معنی‌داری بین انسیدانس درد در دو گروه مشاهده نشد. همچنین تداوم درد نیز در گروه Case کمتر از گروه کنترل بود.