

بررسی ارتباط بین خونریزی هنگام پروپ کردن با مصرف سیگار در پاکتهای با عمق متوسط

استاد راهنما: دکتر هومن مهریزی

نگارش: مریم کافی

شماره: ۱۶۵

چکیده

مقدمه:

الگوی پیشرفت بیماری و تابلوی کلینیکی بیماری پریدونتال بین افراد سیگاری و غیر سیگاری دارای تفاوت است که توجه به آن جهت تشخیص و ارائه طرح درمان مناسب، ضروری است. این امر در مورد بیماران borderline اهمیت دو چندان می‌یابد. در این بیماران که دارای پاکتهای با عمق ۶۴mm هستند. تنها ملاک مشخص نیاز به جراحی، وجود خونریزی هنگام پروپ کردن می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت احتمالی BOP (خونریزی هنگام پروپ کردن) در این دسته از بیماران در پاکتهای با عمق ۴-۶mm می‌باشد.

مواد و روشها:

جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۹ بیمار سیگاری و غیرسیگاری با میانگین سنی ۳۷/۹ سال، مراجعه‌کننده به کلینیک دندانپزشکی رفسنجان در سال ۸۳ می‌باشد. این جمعیت در دو گروه تقسیم شدند ۱- شامل ۱۱ بیمار غیر سیگاری دارای ۳۳۹ ناحیه با عمق ۴-۶mm با پریدونتیت مزمن.

۲- شامل ۸ بیمار سیگاری با ۴۴۸ ناحیه با عمق ۴-۶mm با پریدونتیت مزمن.

گروه اول: به عنوان گروه شاهد و گروه دوم مورد می‌باشد. در هر گروه شیوع BOP تعیین گردید.

نتایج:

نتایج مطالعه نشان داد که:

۱- BOP (خونریزی هنگام پروپ کردن) و GI (ایندکس لثه) در گروه سیگاریها به طرز معنی‌داری کمتر از گروه غیر سیگاریها می‌باشند.

۲- بین دو گروه در PI (ایندکس پلاک) و AL (حد چسبندگی) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و این نشان می‌دهد که پارامترهای کلینیکی بهم نزدیک می‌باشند و نتیجه‌گیری دقیق است.

نتیجه‌گیری:

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که خونریزی هنگام پروپ کردن در سیگاریها کمتر از غیر سیگاریها می‌باشد.

واژگان کلیدی: سیگار کشیدن، بیماری پریدونتالغ خونریزی هنگام پروپ کردن

www.rums.ac.ir