

تعیین فراوانی ضایعات غیر سرطانی ناشی از مصرف سیگار در مراجعان به دانشکده دندانپزشکی

رفسنجان از ابتدای دی ماه ۸۷ تا پایان خرداد ۸۸

استاد راهنما: ابوالقاسم شهاب احمدی

نگارش: شیلا شهسواری

شماره: ۲۸۹

چکیده

مقدمه:

از جمله معضلاتی که جهان امروز با آن مواجه است و سلامت انسان ها را به شدت تهدید میکند مصرف سیگار است. سیگار علاوه بر اثرات مضر که بر سلامت عمومی بدن اعمال میکند، منشا بروز پاره ای از بیماری ها در حفره دهان نیز میباشد که شامل اثر بر دندان ها و بافت نرم دهان است. مهمترین و مخرب ترین اثر سیگار بر حفره دهان سرطان است که در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته، لذا در مطالعه حاضر به بررسی ضایعات قیره سرطانی ناشی از مصرف سیگار می پردازیم.

مواد و روش ها:

در این مطالعه افراد سیگاری مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رفسنجان به مدت شش ماه (از دیماه ۸۷ تا خرداد ۸۸) مورد معاینه قرار گرفته و پرسشنامه ای برای هر کدام تکمیل گردید. در این پرسش نامه اطلاعاتی از قبیل اطلاعات جامه شناختی بیمار، سابقه و میزان مصرف سیگار و نوع و توصیف ضایعه موجود در دهان وی توسط یک نفر معاینه گر به طور کامل ثبت شد و تشخیص های لازم برای آن ضایعه بالینی تعیین گردید. نهایتاً با استخراج اطلاعات خام از این پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS16 و تجزیه و تحلیل آنها نتایج نهایی بدست آمد.

یافته ها:

از ۱۶۵ نفر فرد سیگاری مراجعه کننده ۶۷.۳٪ واجد پریدونتیت و جینجیویت، ۶۰.۶٪ زبان سیاه مودار، ۷۰.۳٪ نیکوتینیک استوماتیت، ۳٪ لکوپلاکیا، ۳۹.۴٪ لکودام، ۶۰٪ اسموکر ملانوز و ۷۴.۵٪ دارای جرم فوق لثه ای بودند.

نتیجه گیری:

شیوع ضایعات خوش خیم ناشی از مصرف سیگار در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی رفسنجان از ابتدای دی ماه ۱۳۸۷ تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۸ به ترتیب به صورت زیر میباشد: جرم فوق لثه ای ۷۴.۵٪، نیکوتینیک استوماتیت ۷۰.۳٪، پریدونتیت و جینجیویت ۶۷.۳٪، زبان سیاه مودار ۶۰.۶٪، اسموکر ملانوز ۶۰٪، لکودام ۳۹.۴٪، لکوپلاکیا ۳٪.

بیشترین فراوانی مربوط به جرم و کمترین فراوانی مربوط به لکوپلاکیا بود.

www.rums.ac.ir