

شیوع شکستگی‌های دندان‌های حسین کشیدن دندان

استاد راهنما: دکتر محسن رنجبری

نگارش: محمد دریائیان

شماره: ۱۰۶

چکیده

شکستگی دندان‌های حسین کشیدن دندان پدیده‌ای است که شیوع نسبتاً زیادی دارد. در این تحقیق بررسی شیوع شکستگی دندان‌های حسین کشیدن دندان با توجه به متغیرهای نوع پوسیدگی دندان‌ها، نوع دندان، جنس عمل کننده و عمل شونده، ترم تحصیلی عمل کننده، وجود انحنای ریشه‌ای، وجود انکیلوز ریشه‌ای و گروه سنی بیماران به عمل آمد. روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‌های بود که قبل از کشیدن دندان توسط دانشجو تکمیل می‌شد و اگر شکستگی دندان‌های حسین کشیدن دندان اتفاق می‌افتاد با گرفتن کلیشه رادیوگرافی پری اپیکال از دندان مذکور، اطلاعات مرتبط با رادیوگرافی در پرسشنامه درج می‌شد، سپس پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شده و نتایج حاصل از اطلاعات آن پس از تجزیه و تحلیل توسط کامپیوتر به صورت نمودارها ارائه گردید.

نتایجی که از بررسی شکستگی دندان‌های حسین کشیدن دندان به عمل آمد نشان می‌دهد که بیشترین شیوع شکستگی دندان‌ها در پوسیدگی‌های کلاس II دو طرفه و کلاس V در دندان‌های رخ داده است، همچنین این تحقیق نشان داد که شکستگی دندان‌ها در یک نوع دندان با یک نوع پوسیدگی مشابه در زنان بیشتر از مردان رخ داده است و همچنین دانشجویان پسر بیش از دختران با شکستگی دندان‌ها مواجه شده‌اند.

این تحقیق نشان داد که دانشجویان ترم پایین‌تر (ترم) بیشتر از دانشجویان ترم بالاتر (ترم ۱۲) با شکستگی دندان‌ها مواجه بوده‌اند. در این بررسی شیوع شکستگی دندان‌ها در گروه سنی ۲۰-۲۹ ساله‌ها گزارش گردید و همچنین از کل دندان‌های کشیده شده تنها با ۴ مورد انکیلوز مواجه بوده‌ایم. و نیمی از دندان‌های شکسته شده، دارای انحنای ریشه‌ای بودند. اطلاعات این تحقیق نشان داد که یک چهارم از دندان‌های شکسته شده سابقه درمان اندو داشته‌اند و همچنین شیوع شکستگی دندان‌ها در افغانی‌ها بیشتر از ایرانی‌ها بوده است.