

بررسی میزان فراوانی آنومالیهای تکاملی بافت نرم دهان در دانش‌آموزان دبیرستانهای

شهر بندرعباس در سال ۸۴

استاد راهنما: دکتر کامیار علوی

نگارش: هما فراقی

شماره: ۲۱۸

چکیده

سابقه و هدف:

ناهنجاریهای تکاملی متعددی در مخاط دهان دیده می‌شوند. که ممکن است ارثی یا مادرزادی باشند. فراوانی این ضایعات رد جوامع مختلف متفاوت است تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی آنومالیهای تکاملی نسج نرم دهان در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس در سال ۱۳۸۴ انجام شده است.

مواد و روشها:

۶۷۴ دانش‌آموز (۳۲۰ پسر و ۳۵۴ دختر) با نمونه‌گیری خوشه‌ای از دبیرستانهای شهر بندرعباس مورد معاینه قرار گرفتند معاینات با کمک آئینه و سوند و پنس دندانپزشکی و در نور اتاق انجام شد. در صورت لزوم از نور چراغ قوه استفاده شد. معاینات توسط یک دانشجوی سال آخر دندانپزشکی انجام گرفت و ضایعات مشکوک به متخصص بیماریهای دهان ارجاع شد. نتایج به صورت توصیفی و تحلیلی (با آزمونهای کای مربع و آزمون دقیق فیشر) ارزیابی شدند. $P < 0/05$ معنی‌دار تلقی شد.

نتایج:

۱۲٪ افراد دارای حداقل یک ناهنجاری بودند. فراوانی پیت گوشه لب (۵/۸٪) پاپیلای رترو کاسپید (۱/۵٪) و ماکرو گلوسی (۱/۲٪) از سایر ضایعات بیشتر بود.

نتیجه گیری و بحث:

ناهنجاریهای تکاملی در درصدی از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس دیده می‌شود که نشان می‌دهد باید به این ضایعات توجه کافی داشت.

www.rums.ac.ir