

مقدمه: حفره خشک (Dry Socket) یکی از عوارض نسبتاً شایع در آوردن دندان ها می باشد که موجب صرف وقت و هزینه زیاد برای دندانپزشک و بیمار می گردد و تا به امروز سبب شناسی (اتیولوژی) کاملاً مشخصی برای آن یاد نشده است. مطالعه حاضر جهت بررسی شیوع حفره خشک و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های شهری رفسنجان در سال 1392 میباشد.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که بر روی 2000 نفر بیمار انجام گرفت. ابتدا در مورد علائم حفره خشک توضیحات کامل به دندانپزشک شاغل در درمانگاه ارائه شد و اطلاعات بیماران در پرسشنامه ثبت گردید و اقدام به خارج کردن دندان نمودند سپس بیمارانی که با علائم حفره خشک مراجعه نمودند معاینه شده و اطلاعات آن ها استخراج و مورد بررسی آماری قرار گرفت.

یافته ها: از 2000 دندان کشیده شده ، 66 مورد دچار عارضه حفره خشک شدند که شیوع کلی آن 3/3 درصد بود و شیوع آن در مردان 2/4٪ و در زنان 4/3٪ بدست آمد. در این مطالعه رده سنی 40-49 سال بیشترین شیوع را نشان دادند ($P < 0/001$) همچنین در ناحیه مولر فک پایین به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر از نواحی دیگر مشاهده گردید. در این مطالعه عواملی مانند استعمال دخانیات ($P < 0/001$) و مصرف قرص های ضدبارداری ($P = 0/051$) و تروما به دندان حین کشیدن ($P = 0/027$) میزان بروز حفره خشک را به طور معنی داری افزایش دادند.

نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که ایجاد حفره خشک میتواند رابطه معنی داری با سن،جنسیت،آسیب حین کشیدن دندان،مصرف سیگار و مصرف قرص ضدبارداری در خانم ها داشته باشد.

کلید واژه ها: حفره خشک، کشیدن دندان، اتیولوژی

